

Leflunomide en teriflunomide



Leflunomide en teriflunomide wijzigen het effect van VKA's.

Situatie	Actie
1. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: VKA• start: leflunomide of teriflunomide	Melden aan de trombosedienst. Instrueer de patiënt bij staken van het leflunomide of teriflunomide contact op te nemen met de trombosedienst
2. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: leflunomide of teriflunomide• start: VKA	Instrueer de patiënt bij staken van leflunomide of teriflunomide contact op te nemen met de trombosedienst.
3. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: leflunomide of teriflunomide• in gebruik: VKA	
4. <ul style="list-style-type: none">• staken: leflunomide of teriflunomide• in gebruik: VKA	

5. Actie wanneer de trombosedienst niet bereikbaar is

Leflunomide of teriflunomide mag worden afgeleverd.

Zo snel mogelijk of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag melden aan trombosedienst.

6. Overige opmerkingen en aandachtspunten

Na toevoegen van leflunomide aan warfarine is een toename van de INR gemeld. In 1 geval is hematurie gemeld.

Na toevoegen van teriflunomide aan warfarine is een afname van 25% in de peikwaarde van de INR waargenomen. Teriflunomide heeft geen effect op de farmacokinetiek van s-warfarine.